



## Ik heb geen verhoging en klachten van verkoudheid



## Ik heb verhoging en klachten van verkoudheid



## Ik ga binnenkort met een nieuwe behandeling beginnen, kan dat doorgaan?

Als je binnenkort met een nieuwe behandeling gaat beginnen, kan dat doorgaan als dat een behandeling is die de afweer tegen virusinfecties niet of nauwelijks onderdrukt en die geen invloed heeft op het aantal witte bloedcellen: glatirameeracetaat (Copaxone; glatirameeracetaat Mylan), interferon (Avonex, Betaferon, Plegridy, Rebif) en natalizumab (Tysabri).

Als je gaat beginnen met een behandeling die de afweer voor kortere of langere tijd deels onderdrukt (alemtuzumab (Lemtrada), cladribine (Mavenclad), ocrelizumab (Ocrevus), dimethylfumaraat (Tecfidera), fingolimod (Gilenya) en teriflunomide (Aubagio)) is het advies contact op te nemen met uw neuroloog. Wat het beste is hangt af van uw individuele situatie (bijvoorbeeld ernst van de MS). Daarover is geen algemeen advies te geven.

## Bron

De bron van deze informatie is afkomstig van het VUMC: <https://www.vumc.nl/nieuws/nieuwsdetail/vragen-over-coronavirus-en-ms.htm>  
 Ze publiceerden deze informatie op **16-3-2020**. De informatie kan snel veranderen, houdt daarom onze website in de gaten voor de nieuwste updates:  
<http://www.msinbeeld.nl/ms-en-corona/>